

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Бромазепам-Чайкафарма 3 mg таблетки

Bromazepam-Tchaikapharma 3 mg tablets

(Бромазепам/Bromazepam)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Бромазепам-Чайкафарма и за какво се използва
2. Преди да приемете Бромазепам-Чайкафарма
3. Как да приемате Бромазепам-Чайкафарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бромазепам-Чайкафарма
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БРОМАЗЕПАМ-ЧАЙКАФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Бромазепам – Чайкафарма съдържа активната съставка бромозепам, която принадлежи към групата лекарства, известни като бензодиазепини. Бромазепам – Чайкафарма се назначава за премахване на психическото напрежение и тревожността.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ БРОМАЗЕПАМ-ЧАЙКАФАРМА

Не приемайте Бромазепам-Чайкафарма

- ако сте алергични към бромозепам или към някоя от останалите съставки на Бромазепам-Чайкафарма.
- ако имате алергия към друго лекарство от групата на бензодиазепините
- ако страдате от миастения гравис (тежка мускулна умора)
- ако страдате от остра тесногълна глаукома
- ако страдате от тежко чернодробно заболяване
- ако имате белодробно заболяване
- ако имате затруднено дишане по време на сън

Обърнете специално внимание при употребата на Бромазепам-Чайкафарма

Непременно информирайте лекаря, ако имате белодробно, чернодробно или бъбречно заболяване. При намалена функция на бъбреците, лекарят може да предпише по-ниски дози бромозепам, но при тежка недостатъчност, бромозепам не бива да се използва.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Съществуват определени лекарства, като антидепресанти, някои антибиотици, циметидин и пропранолол, които могат да повишат ефекта на бромазепам.

От своя страна бромазепам може да повиши ефектите на алкохол, антидепресанти, невролептици, някои аналгетици, хипнотици, антихистамини, антиконвулсанти.

Използването на бромазепам или други бензодиазепини може да доведе до зависимост. Следвайте точно инструкциите на лекаря: не приемайте повече таблетки и не удължавайте лечението повече от това, което ви е предписал той.

Употреба на Бромазепам-Чайкафарма с храни и напитки

Приемайте таблетките с вода или друга безалкохолна напитка.

Не употребявайте алкохол по време на лечението с бромазепам.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Не вземайте това лекарство ако сте бременна или планирате да забременеете.

Бромазепам-Чайкафарма може да се използва по време на бременност само по изрично лекарско предписание, когато ползата надхвърля риска за новороденото.

Използването на бромазепам в последните месеци на бременността предизвиква понижаване на кръвното налягане, дихателна недостатъчност, и абстинентен синдром у новороденото.

Не приемайте бромазепам ако кърмите, тъй като той преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Бромазепам може да предизвика сънливост или да повлияе концентрацията Ви. Това може да се отрази на изпълнението на задачи, при които се изисква сръчност. По тази причина при лечение с бромазепам избягвайте шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ БРОМАЗЕПАМ-ЧАЙКАФАРМА

Винаги приемайте Бромазепам-Чайкафарма точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Той ще определи най-подходящата за Вас доза. Тя е строго индивидуална и зависи от тежестта на симптомите, възрастта, индивидуалната реакция към лекарството и състоянието Ви.

Обикновено лечението започва с ниска начална доза, която постепенно се увеличава, до постигане на желания ефект.

При извънболнично лечение препоръчаната доза за пациенти е 1,5 до 3 mg бромазепам, прилагани 3 пъти дневно.

При тежки случаи и при болнично лечение дозата може да бъде увеличена до 6-12 mg бромазепам, прилагани 2-3 пъти дневно.

Ако сте в напреднала възраст или имате чернодробно и/или бъбречно заболяване Вашият лекар ще Ви предпише по-ниска доза от обикновено препоръчаната.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бромазепам-Чайкафарма

Ако вземете твърде много таблетки или някой друг по грешка вземе от Вашето лекарство, веднага се консултирайте с лекар или се обърнете към най-близката болница за помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Бромазепам-Чайкафарма

Ако забравите да вземете една доза, не трябва да я компенсирате като удвоите следващата. Вместо това трябва просто продължете със следващата доза, когато дойде времето.

Не променяйте предписаната доза по собствено решение. Ако прецените, че ефектът на лекарството е прекалено слаб или твърде силен, обсъдете това с Вашия лекар.

Ако сте спрели приема на Бромазепам-Чайкафарма

Вашият лекар ще Ви посъветва кога и как да прекратите лечението.

Прекратяването на лечението най-често става чрез постепенно намаляване на дозата.

Общата продължителност на лечението обикновено не трябва да бъде повече от 8-12 седмици, включително периода на постепенно намаляване на дозата.

Внезапното прекратяване на лечението може да доведе до развитие на абстинентен синдром, който може да се изрази в главоболие, мускулни болки, силна тревожност, напрежение, безпокойство, объркване и раздразнителност. При тежки случаи може да се появят промени в поведението, боджежи, повишена чувствителност към светлина, шум и допир, халюцинации или гърчове.

При прекратяване на лечението може да се появи отново основният проблем, поради който сте започнали да вземате лекарството. По-малко вероятно е това да се случи, ако дозата в края на лечението се намалява постепенно.

Ако по някаква причина сте продължили лечението по-дълго време, то трябва да се консултирате с лекар относно спирането му. Той може да Ви предпише следене на кръвната картина и чернодробната функция едновременно с постепенно му спиране.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, X може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При чувствителни пациенти, както и при приемането приемащи високи дози бромазепам може да се наблюдава отпуснатост и замаяност. Тези нежелани ефекти обикновено отзвучават при намаляване на дозата.

Както при другите бензодиазепини, продължително използване на бромазепам може да причини зависимост, а рязкото спиране на терапията да доведе до абстинентен синдром. При деца и възрастни бромазепам може да причини парадоксални реакции, като възбуда и халюцинации.

Рядко се наблюдават мускулна слабост, обърканост, нарушение в походката, нарушение на съня, неадекватно поведение, намален тонус, нарушение в говора, намалена памет.

Много рядко са наблюдавани случаи на нарушаване на менструалния цикъл, намалено либидо, нарастване на млечните жлези при мъжа и реакции на свръхчувствителност.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БРОМАЗЕПАМ-ЧАЙКАФАРМА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте на тъмно и сухо, при температура под 25 °С.

Не използвайте Бромазепам-Чайкафарма след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Бромазепам-Чайкафарма

- Активното вещество е: бромазепам
- Другите съставки са: микрокристална целулоза, натриев полакрилин, магнезиев стеарат, лак зелен жълт, лактоза, колоидален силициев двуокис.

Как изглежда Бромазепам-Чайкафарма и какво съдържа опаковката

Таблетките се предлагат в блистерни опаковки по 20 или 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД,
бул. “Г.М.Димитров” 1, гр. София 1172, България

Име и адрес на производителя:

“Чайка фарма Висококачествените Лекарства” АД
“Н.Й.Вапцаров” №1, гр. Варна 9000, България

или

“Чайка фарма Висококачествените Лекарства” АД
бул. Санкт Петербург № 53, гр. Пловдив 4000, България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба:

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
1172 София, бул. “Г.М.Димитров” №1
тел. 02 / 962 54 54
факс: 02/ 960 37 03
e-mail: info@tchaikapharma.com

Дата на последно одобрение на листовката

Март, 2008